

LOTION CONCENTRÉE instrukcija

SKIRIAMOS DVI PAGRINDINĖS PLAUKŲ SLINKIMO KATEGORIJOS:

Progresyvusis plaukų slinkimas (androgeninis):

ties genetinių, tiek hormoninių veiksnių nulemta vyrų ir (arba) moterų androgeninė alopecija, dėl kurios lėtai, bet progresuojančiai silpnėja plauko svogūnėlis tol, kol galutinai atrofuojasi.

Reaktyvusis plaukų slinkimas (laikinas):

staigus, stiprus ir nenormalus plaukų slinkimas, sukeliantis skirtingo intensyvumo plaukų retėjimą, dėl kurio gali susiformuoti vietos, kuriose plaukų nelieka visiškai. Reaktyvusis plaukų slinkimas yra laikino plauko gyvavimo ciklo sutrikimo padarinys. Šį sutrikimą gali sukelti ir vidiniai, ir išoriniai faktoriai, tokie kaip: stresas, mityba, hormoniniai pokyčiai, gimdymas ar menopauzė, medikamentai, UV ir rentgeno spinduliai bei kt.

MEDAVITA SPRENDIMAS: LOTION CONCENTRÉE PRIEMONĖS

Shampoo trattante anticaduta* pH 5.5 (*Anti-hair loss treating shampoo)** šampūnas nuo plaukų slinkimo
Trattamento intensivo anticaduta* pH 3.5 (*Anti-hair loss intensive treatment)** intensyvaus poveikio plaukų slinkimo prevencijos priemonė

Veikliosios medžiagos, padedančios įveikti plaukų slinkimą: ankstyvieji šalpusniai, kraujažolės, raudonieji chininmedžiai, cinamonas, alavijai, arnikos, baliniai ajerai, imbierai, kamparas, galbaninės ferulos, miramedžiai, muskatai, rozmarinai.

NAUDOJIMAS:

- Tepkite 7–15 ml šampūno „*Anti-hair loss treating shampoo*“ tiesiai ant galvos odos ir masažuokite, kad tolygiai paskirstytumėte;
- Išplaukite ir pakartokite procedūrą su 5–10 ml priemonės;
- Nusausinkite plaukus ir naudokite priemonę „*Anti-hair loss intensive treatment*“;
- Tepkite losjoną ant visos galvos odos, ypač vietas, kuriose plaukai labiausiai išretėję;
- Masažuodami švelniai paskirstykite, nenuskalaukite;

DOZAVIMAS ampulėmis 13x6 ml:

ANDROGENINIO PLAUKŲ SLINKIMO ATVEJU 1 FAZĖ: 1 ampulė per dieną 2 savaites 2 FAZĖ: 3 ampulės per savaitę 4 savaites
REAKTYVIOJO PLAUKŲ SLINKIMO ATVEJU 1 FAZĖ: 3 ampulės per savaitę 4 savaites 2 FAZĖ: 2 ampulės per savaitę 6 savaites
PREVENCIJA IR PALAIKYMAS 1–2 ampulės per savaitę

DOZAVIMAS purškiamo losjono 100 ml*:

ANDROGENINIO PLAUKŲ SLINKIMO ATVEJU 1 FAZĖ: 6/7 ml per dieną 2 savaites 2 FAZĖ: 6/7 ml 3 kartus per savaitę 4 savaites
REAKTYVIOJO PLAUKŲ SLINKIMO ATVEJU 1 FAZĖ: 6/7 ml 3 kartus per savaitę 4 savaites 2 FAZĖ: 6/7 ml 2 kartus per savaitę 6 savaites
PREVENCIJA IR PALAIKYMAS 6/7 ml 1-2 kartus per savaitę

* 1 ampulė 6 ml = 40/45 papurškimai.